

Cyracid 2.0


Company:
Contact Person:
Date:
Agent:



Arthur Schopf Hygiene
GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1
D-83115 Neubeuern

Cyracid 2.0

Granulát na hubení muších larev



- Přípravek můžete použít také v obsazených stájích
- Žádné rezistence

Vlastnosti:

Cyracid 2.0 je ve vodě rozpustný granulát na hubení muších larev. Obsahuje účinnou látku Cyromazine, která přeruší vývojový cyklus much, ale nemá vliv na hubení dospělých much. Cyracid 2.0 se používá pro likvidaci všech druhů muších larev jako jsou larvy mouchy domácí, larvy ovádů, larvy pestřenky trubcové - Eristalis tenax a jiných larev které se vyvíjejí v hnoji nebo v podestýlce chovu skotu, telat, prasat nebo drůbeže. Přípravek můžete aplikovat formou rozptýlu, polití pomocí kropicí konve nebo formou postřiku pomocí zádového postřikovače. Aplikujte hlavně na líhniště much jako je hnůj, podestýlka atd. Po 10 až 20 dnech po první aplikaci se populace much významně sníží.

Cílový organismus:

pro likvidaci všech druhů muších larev (larvy mouchy domácí, larvy ovádů, larvy pestřenky trubcové - Eristalis tenax a jiných larev které se vyvíjejí v hnoji nebo v podestýlce)

Oblast použití:

Chov skotu, telat, prasat a drůbeže a jiné oblasti kde se líhnou mouchy

Tabulka aplikace:

	Cyracid 2.0	+ vody	Dostačující na m ²
Aplikace formou rozptýlu	500g	--	20m ²
Aplikace formou polití	500g 5kg	+ 15 litrů vody + 150 litrů vody	20m ² 200m ²
Aplikace formou postřiku	500g	+ 5 litrů vody	20m ²

Návod k použití:

Aplikace

První aplikaci proveďte 5 dní po vykydání hnoje. Podle typu aplikace, rozpustte granulát podle výše uvedené tabulky. Zvolte formu aplikace která je pro vás nejvhodnější. Dejte si pozor aby jste ošetřili všechny oblasti kde se líhnou mouchy například hnůj, hlubokou podestýlku, kádlové kanály a další. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Zvyšuje se objem hnoje

Cyramid 2.0

Company:
Contact Person:
Date:
Agent:



Arthur Schopf Hygiene
GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1
D-83115 Neubeuern

jen pomalu, můžete interval aplikace prodloužit na 21 dní. Po 10 až 20 dnech po první aplikaci se populace much významně sníží.

Spotřeba:

- Chov telat (calve breeding):

Doporučuje se první aplikaci provést po 1-3 dnech, po ustájení telat do stáje. Aplikujte přípravek přímo na hnůj. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 3 aplikace.

Spotřeba na 20 metru podestýlky:

Při aplikaci formou polítek pomocí konvice:

250g + 10 litrů vody

Při aplikaci formou postřiku pomocí zádobového postřikovače: 250 g + 1 až 4 litry vody

- Telecí plochy na mléčných farmách:

Opakujte aplikaci po 14 dnech.

Spotřeba na 20 metru podestýlky:

Aplikace formou polítek pomocí konvice:

250g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádobového postřikovače: 250 g + 1 až 4 litry vody

- Chovné stanice skotu s roštovou podlahou

Aplikujte přípravek rovnoměrně na celou podlahu. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 2 aplikace.

Spotřeba na 10m² roštové podlahy:

Aplikace formou rozptýlu: 250g

Aplikace formou polítek pomocí konvice:

250g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádobového postřikovače: 250g + 1-4 litry vody

- Chov prasat s plnými a částečnými roštovými podlahami

Plná roštová podlaha:

Aplikujte přípravek rovnoměrně na celou podlahu v boxu, než zvířata ustájíte. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 2 aplikace.

Částečná roštová podlaha:

Aplikujte přípravek na rošty pomocí konvice nebo zádobového postřikovače. Ošetřete také okrajové zóny, odpočinkové zóny, např. i plochy vedle / pod krmítkem, kde se často nachází zbytky krmiva nebo hnůj. Informace k aplikaci: viz roštová podlaha.

Spotřeba na 10m²:

Aplikace formou rozptýlu: 250g

Aplikace formou polítek pomocí konvice: 250g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádobového postřikovače: 250g + 1-4 litry vody

Cyramid 2.0

Company:
Contact Person:
Date:
Agent:



Arthur Schopf Hygiene
GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1
D-83115 Neubeuern

- Chov drůbeže s hlubokou jámou (baterie a stáje "flatdecks")

Aplikujte přípravek rovnoměrně na celý povrch hnoje. Nejlepších výsledků dosáhnete, když první aplikaci provedete 1 týden po vykydání hnoje (tzn. Podložka hnoje by neměla být tlustší než 10cm). Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 2 aplikace.

Spotřeba na 10m²:

Aplikace formou rozptýlu: 250g

Aplikace formou polití pomocí konvice: 250g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádového postřikovače: 250g + 1-4 litry vody

Poznámka:

Upřednostněte tekutou aplikaci, pokud chcete produkt aplikovat na hlubokou podestýlku (skot, prasata, koně).

Účinná látka:

20g/kg Cyromazine

Balení:

1000g

5kg